



MonaLisa Touch™





NOWOCZESNA GINEKOLOGIA

Termin ten odnosi się głównie do procedur medycznych, w tym chirurgicznych, mających na celu korektę wyglądu okolic intymnych. Problemy, jakie leczy się tymi metodami, nie tylko naruszają normy estetyczne i wpływają na stan psychiczny kobiety, ale mogą utrudniać wiele czynności codziennych oraz komplikować życie seksualne.

Dzięki tym zabiegom podnosi się komfort życia kobiety i likwidowane są problemy, które często skutecznie pogarszają jakość ich życia. Coraz częściej schorzenia, które dotychczas leczono wyłącznie operacyjnie, można zlikwidować za pomocą zabiegów bezinwazyjnych. Można uniknąć okresu rekonwalescencji oraz ryzyka pojawienia się komplikacji pooperacyjnych. Do takich nowoczesnych metod zalicza się zabiegi laserowe MonaLisa Touch™.

Laser MonaLisa Touch™ został stworzony z myślą o zdrowiu i pięknie intymnym kobiety. Jego producentem jest włoska firma DEKA, posiadająca ponad 30 letnie doświadczenie w tworzeniu technologii laserowych. Powstała 1981 roku, stając się natychmiast liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży urządzeń laserowych przeznaczonych dla rynku medycznego.

Dziś DEKA oferuje szeroką gamę medycznych systemów laserowych wyprodukowanych w oparciu o wieloletnie badania i doświadczenie ekspertów naukowych pracujących dla firmy.

Doskonała jakość, innowacyjność i skuteczność technologii stworzonych przez DEKA potwierdzona badaniami klinicznymi, zapewnia jej stabilną i wiodącą pozycję na międzynarodowym rynku medycyny.

MonaLisa Touch™



ŻYCIE SEKSUALNE

Udane życie seksualne odgrywa bardzo istotną rolę w relacji z partnerem. Związki uczuciowo-seksualne pozwalają na nawiązanie głębokiego porozumienia z drugą osobą. Budują poczucie pewności siebie, wysoką samoocenę i dobre samopoczucie.

PROBLEM

Liczne, trudne lub zabiegowe porody, okres menopauzy, problem nietrzymania moczu, czy też nieatrakcyjna budowa anatomiczna mogą powodować zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu ciała kobiety. To z kolei wpływa na spadek jej samooceny, zamknięcie w sobie i unikanie kontaktów intymnych. Ginekologia estetyczna przychodzi z pomocą wszystkim kobietom, które pragną poprawić wygląd i atrakcyjność zewnętrznych narządów płciowych oraz poprawić ich funkcje seksualne, tym które chcą podnieść komfort własnego życia seksualnego, poprawić samoocenę, ułatwić przeżywanie w pełni doznań erotycznych.

ROZWIĄZANIE

Zabiegi rewitalizacji i liftingu pochwy, korekty budowy anatomicznej wykonuje się przy wykorzystaniu lasera MonaLisa Touch™. Oddziałuje on na ścianki pochwy lub wargi sromowe, powodując tzw. fototermiczne, nieablacyjne napięcie i obkurczenie pochwy. Na skutek działania lasera dochodzi do stymulacji kolagenu w błonie śluzowej. W efekcie dochodzi do zwiększenia napięcia tkanek. Błona śluzowa pochwy staje się bardziej elastyczna i napięta. Poprawie ulegają doznania w trakcie stosunku, polepsza się jakość i komfort życia. Zapobiega to również możliwości pojawienia się wysiłkowego nietrzymania moczu.

EFEKTY

Odbudowa błony śluzowej
Lepsze nawilżenie pochwy
Zmniejszenie i poprawa elastyczności pochwy
Redukcja nietrzymania moczu

PRZEBIEG ZABIEGU

Odbudowa błony śluzowej, poprawa elastyczności pochwy, redukcja problemu nietrzymania moczu.

Do zabiegu kwalifikuje pacjentkę lekarz oraz wynik aktualnego badania cytologicznego.

Zabieg MonaLisa Touch™ wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w skaner, którą lekarz wprowadza do wnętrza pochwy. Laser działa bezpośrednio na jej ścianki, powodując mnóstwo precyzyjnie rozmieszczonych mikrourazów w śluzówce, co skutkuje powstaniem nowych młodych komórek i gruczołów. Wpływa to na gruntowną przebudowę całej śluzówki pochwy. Zabieg zapewnia obkurczenie pochwy, odbudowę błony śluzowej oraz redukcję problemu nietrzymania moczu bez interwencji chirurgicznej.

Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga znieczulenia oraz okresu rekonwalescencji. Po ok. 3 dniach można wrócić do życia seksualnego.

KOREKCJA WARG SROMOWYCH

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. W przypadku modelowania tkanek dochodzi do usunięcia ich nadmiaru lub korekty z równoczesną koagulacją tkanek (zamknięciem naczyń krwionośnych). Dzięki temu uzyskuje się minimalną inwazyjność, krótki czas hospitalizacji i szybką rekonwalescencję. Bez wątpienia to elementy, które stanowią silny argument przemawiający na korzyść stosowania terapii laserem.

MonaLisa Touch™



MENOPAUAZA

Menopauza nie jest chorobą lecz nowym rozdziałem kobiecości. Wciąż jednak pokutują liczne stereotypy, które istotnie wpływają na sposób jej postrzegania. Kluczową kwestią we współczesnym podejściu do seksualności kobiety na różnych etapach jej życia jest zrozumienie istoty satysfakcji seksualnej, która może mieć wymiar bardziej emocjonalny niż fizyczny. Kompleksowe podejście do seksualności kobiety, staje się szczególnie trudne w okresie około menopauzalnym.

PROBLEM

W okresie menopauzy narządy intymne kobiet ulegają procesom starzenia, związanym ze spadkiem poziomu estrogenu. Nawet 50% kobiet po menopauzie skarży się na typowe objawy atrofii narządów płciowych, takich jak: suchość pochwy, ból podczas stosunku płciowego, podrażnienia objawiające się swędzeniem i pieczeniem. Objawy te powodują zmniejszenie doznań i satysfakcji seksualnej oraz obniżenie jakości życia i samopoczucia psychicznego. W okresie menopauzy spada aktywność fibroblastów znajdujących się w błonie śluzowej pochwy, a tym samym spadek produkcji kolagenu. Wskutek zmniejszenia liczby i aktywności gruczołów śluzowych pojawia się suchość. Błona śluzowa staje się mniej elastyczna, blada, słabo nawilżona i odżywna. Dochodzi do zaniku charakterystycznego pofałdowania śluzówki pochwy i jej ścięć. Powoduje to wzmożoną podatność na zakażenia i mikrourazy. Pojawiające się zmiany hormonalne, takie jak spadek estrogenów czy wzrost stężenia gonadotropin, przyczyniają się do powstawania objawów wypadkowych - uderzeń gorąca, nocnych potów, problemów ze snem oraz wielu innych i są naturalnym etapem w rozwoju. Występują uciążliwe objawy zanikowe: zanikowe zapalenie pochwy, zmiany skórne okolic narządów płciowych, wysiłkowe nietrzymanie moczu, hiperaktywny pęcherz moczowy i niestabilność mięśnia wypieracza, a także nawracające zapalenia cewki moczowej i pęcherza moczowego. Dla wielu kobiet zespół rozluźnienia pochwy (VRS) stanowi poważny problem w kontaktach intymnych. Stają się one bardziej skrzępowane, wyraźnie spada ich satysfakcja seksualna.

PRZEBIEG ZABIEGU

Do zabiegu kwalifikuje pacjentkę lekarz oraz wynik aktualnego badania cytologicznego.

Zabieg MonaLisa Touch™ wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w skaner, którą lekarz wprowadza do wnętrza pochwy. Laser działa bezpośrednio na jej ścianki, powodując mnóstwo precyzyjnie rozmieszczonych mikrourazów w śluzówce, co skutkuje powstaniem nowych młodych komórek i gruczołów. Wpływa to na gruntowną przebudowę całej śluzówki pochwy. Zabieg zapewnia obkurczenie pochwy, odbudowę błony śluzowej oraz redukcję problemu nietrzymania moczu bez interwencji chirurgicznej.

Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga znieczulenia oraz okresu rekonwalescencji. Po ok. 3 dniach można wrócić do życia seksualnego.

EFEKTY

Odbudowa błony śluzowej
Lepsze nawilżenie pochwy
Zmniejszenie i poprawa elastyczności pochwy
Redukcja nietrzymania moczu

ROZWIĄZANIE

Niezwykle subtelny, precyzyjny i nieinwazyjny zabieg MonaLisa Touch™ zapewnia obkurczenie pochwy, odbudowę błony śluzowej oraz redukcję problemu nietrzymania moczu bez interwencji chirurgicznej. Kontrolowana energia lasera dostarczana jest do kanału pochwy oraz obszaru jej wejścia, powoduje „ogrzanie” tkanek. Na skutek tego dochodzi do obkurczania się kolagenu w tkance, błona śluzowa pochwy staje się bardziej napięta i elastyczna. Proces ten powoduje zmniejszenie jej wiotkości oraz niwelowanie skutków zespołu rozluźnienia pochwy.

MonaLisa Touch™



NIETRZYMANIE MOCZU

Nietrzymanie moczu to problem na tyle wstydliwy, że często pomijany milczeniem. Szacuje się, że 1 na 4 kobiety cierpi, cierpią lub będzie cierpieć z powodu nietrzymania moczu. Można go więc nazwać problemem powszechnym. Jedynie 25% z nich dzieli się tym problemem ze swoim lekarzem, a ponad 40% kobiet decyduje się na pierwszą wizytę u lekarza dopiero po 5 latach trwania choroby.

Nietrzymanie moczu może dotknąć każdej z nas niezależnie od wieku. Wynika to między innymi z wrażliwości kobiecych narządów na zmiany hormonalne (ciąża, poród, menopauza).

PROBLEM

Wyróżnia się trzy rodzaje problemu nietrzymania moczu:

- Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) wynikające z niewydolności aparatu zamykającego cewkę moczową lub z nadmiernej ruchomości szyi pęcherza moczowego;
- Nagłace nietrzymanie moczu, wynikające ze wzmożonej aktywności mięśnia wypieracza pęcherza moczowego lub zmniejszonej podatności ściany pęcherza na rozciąganie;
- Mieszane nietrzymanie moczu będące połączeniem profili objawowych obu powyższych postaci NM.

ROZWIĄZANIE

Leczenie tej dolegliwości przy pomocy lasera MonaLisa Touch™ jest bezbolesne, nie wymaga znieczulenia, jest nieinwazyjne i nie wymaga hospitalizacji. Polega ono na fototermicznym, nieablacyjnym obkurczeniu pochwy, wzmocnieniu jej ścianek, powięzi wewnątrzmiędniczej oraz obszaru ujścia cewki moczowej. Wiązka laserowa stymuluje włókna kolagenowe śluzówki, co w efekcie prowadzi do ich namnażania i wzmocnienia. Następuje obkurczenie tkanek poddanych zabiegowi, co prowadzi do zmniejszenia kąta nachylenia cewki moczowej i przywraca jej normalną funkcjonalność. Zazwyczaj wystarcza wykonanie jednego zabiegu, aby złagodzić lub usunąć lekkie lub średnio nasilone wysiłkowe nietrzymanie moczu. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po miesiącu.

EFEKTY

Dzięki zabiegom MonaLisa Touch™, które leczą nietrzymanie moczu, kobiety odzyskują komfort zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, a ich życie nie ogranicza już ten krępujący problem. Kobiety odzyskują pewność siebie, co pozytywnie wpływa również na ich kontakty intymne.

PRZEBIEG ZABIEGU

Do zabiegu kwalifikuje pacjentkę lekarz oraz wynik aktualnego badania cytologicznego.

Zabieg MonaLisa Touch™ wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w skaner, którą lekarz wprowadza do wnętrza pochwy. Laser działa bezpośrednio na jej ścianki, powodując mnóstwo precyzyjnie rozmieszczonych mikrourazów w śluzówce, co skutkuje powstaniem nowych młodych komórek i gruczołów. Wpływa to na gruntowną przebudowę całej śluzówki pochwy. Zabieg zapewnia obkurczenie pochwy, odbudowę błony śluzowej oraz redukcję problemu nietrzymania moczu bez interwencji chirurgicznej.

Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga znieczulenia oraz okresu rekonwalescencji. Po ok. 3 dniach można wrócić do życia seksualnego.

MonaLisa Touch™



REHABILITACJA PO PORODZIE

Najczęściej poruszonymi problemami kobiet po porodzie są powrót do wagi sprzed okresu ciąży, rozstępy na skórze czy problem z jej obkurczeniem na brzuchu po urodzeniu dziecka.

Rzadko jednak mówi się o innych problemach natury urodowej, związanych z intymnymi sferami ich ciała. Mowa np. o kroczu i pochwie, które z naturalnych przyczyn po narodzinach dziecka są najbardziej narażone na zmiany.

PROBLEM

Poród naturalny, zwłaszcza kolejny, może spowodować rozluźnienie tkanek pochwy i prowadzić do zespołu rozluźnienia pochwy. Może to powodować zmniejszenie odczuwania satysfakcji z seksu. Zdarza się też, że po porodzie pęcherz odmawia postuszeństwa i młoda mama ma problem z utrzymaniem moczu.

Jeśli ćwiczenia mięśni dna miednicy (tzw. ćwiczenia mięśni Kegla) nie pomagają, można zdecydować się na rewitalizację okolic intymnych (VRS - Vaginal Rejuvenation Surgery).

PRZEBIEG ZABIEGU

Do zabiegu kwalifikuje pacjentkę lekarz oraz wynik aktualnego badania cytologicznego.

Zabieg MonaLisa Touch™ wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w skaner, którą lekarz wprowadza do wnętrza pochwy. Laser działa bezpośrednio na jej ścianki, powodując mnóstwo precyzyjnie rozmieszczonych mikrourazów w śluzówce, co skutkuje powstaniem nowych młodych komórek i gruczołów. Wpływa to na gruntowną przebudowę całej śluzówki pochwy. Zabieg zapewnia obkurczenie pochwy, odbudowę błony śluzowej oraz redukcję problemu nietrzymania moczu bez interwencji chirurgicznej.

Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga znieczulenia oraz okresu rekonwalescencji.

Po ok. 3 dniach można wrócić do życia seksualnego.

ROZWIĄZANIE

Korzyści i bezpieczeństwo zabiegów laserowych sprawiają, że stają się one coraz bardziej popularne.

Za najnowocześniejszy i najbardziej skuteczny uznaje się obecnie laser MonaLisa Touch™ - laser przeznaczony specjalnie do zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej.

Zabieg z wykorzystaniem lasera pomaga odzyskać elastyczność pochwy i przy okazji zmniejszyć jej rozmiar oraz poprawić nawilżenie. Energia lasera ogrzewa błonę śluzową pochwy i zawarty w jej tkankach kolagen. Pod wpływem wysokiej temperatury włókna kolagenowe kurczą się i pojawiają się nowe, co niejako pobudza pochwę do samoregeneracji. Pochwa staje się ciaśniejsza i bardziej elastyczna.

EFEKTY

Już po miesiącu odczuwa się efekty zabiegu - pochwa wraca do kondycji sprzed porodu, jest lepiej nawilżona i ciaśniejsza. To gwarantuje również lepsze doznania podczas seksu. Znika lub w znacznym stopniu zmniejsza się problem nietrzymania moczu.

Liczba zabiegów zależy od indywidualnych potrzeb pacjentki, tzn. od stopnia rozciągnięcia tkanek. Najczęściej wystarczy jeden zabieg, ale jeśli zachodzi potrzeba wykonania kolejnego, wykonuje się je po około 2-4 tygodniach.

MonaLisa Touch™



PLASTYKA WARG SROMOWYCH

Wygląd zewnętrznych narządów intymnych jest bardzo ważny dla każdej kobiety. Wszelkie zmiany ich estetyki to problem, który ma kolosalny wpływ na samoocenę kobiety, jej otwartość na relacje intymne i życie seksualne. Utrudnia również niektóre codzienne czynności. Dlatego też coraz istotniejszą pozycję w ginekologii estetycznej zajmuje rekonstrukcja korekcyjna waginy.

PROBLEM

Zbyt duże lub niesymetryczne wargi sromowe są częstym problemem estetycznym dla kobiet i mogą być przyczyną dolegliwości związanych z codziennym funkcjonowaniem, uprawianiem sportu i aktywnością seksualną. Deformacja oraz asymetria warg sromowych są często wynikiem porodów drogami natury, a przerost (hipertrofia) wynikiem predyspozycji genetycznych lub nadmiernego przyrostu masy ciała.

PRZEBIEG ZABIEGU

W przypadku wyciągnięcia warg sromowych typu I i II, będącego wynikiem utraty jędrności skóry, stosuje się zabieg nieinwazyjny przy wykorzystaniu końcówki skanującej, która działa na obszar zabiegowy skracając włókna kolagenowe oraz prowokując produkcję nowego kolagenu i elastyny. W efekcie dochodzi do zagęszczenia i ujędrnienia skóry. Procedura przebiega identycznie jak np. w przypadku leczenia problemu nietrzymania moczu.

Przed wykonaniem zabiegu laserowego przeprowadzany jest wnikliwy wywiad ginekologiczny. Po przeprowadzonej rozmowie odbywa się badanie ginekologiczne, podczas którego lekarz jest w stanie wykluczyć ewentualne przeciwwskazania oraz anatomiczne zmiany, które wykluczają z wykonania zabiegu.

W przypadku wyciągnięcia warg sromowych typu III i IV oraz innych deformacji, asymetrii lub hipertrofii stosuje się metodę chirurgiczną – labioplastykę. Zabiegi wykonywane laserem MonaLisa Touch™, relatywnie osiągają dużo lepsze wyniki od procedur przeprowadzanych przy użyciu skalpela. Laser stymuluje koagulację tkanki, dzięki czemu nie występuje krwawienie. Zmniejsza to ryzyko powstawania blizn pooperacyjnych, redukuje obrzęmie obszaru zabiegowego oraz dyskomfortu po zabiegu i radykalnie skraca czas rekonwalescencji. Laser nie tylko modeluje zewnętrzne intymne obszary ciała kobiety, ale też zwiększa zawartość i elastyczność tkanki poprzez stymulację produkcji kolagenu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

ROZWIĄZANIE

Korekcja tych defektów, w zależności od rodzaju problemu lub stopnia jego zaawansowania, możliwa jest dzięki chirurgicznemu lub nieinwazyjnym procedurom wykonywanym laserem MonaLisa Touch™.

Zabiegom tym poddają się zarówno kobiety bardzo młode jak i dojrzałe. Przywrócenie estetyki obszaru intymnego znacznie wpływa na poprawę samopoczucia pacjentki i jej samooceny. Czynniki fizjologiczne i funkcjonalne są równie istotne i poprawiają komfort życia kobiety.

EFEKTY

Dzięki zabiegowi labioplastyki MonaLisa Touch™ kobieta uzyskuje estetyczny wygląd zewnętrznych narządów intymnych oraz odzyskuje pewność siebie i radość z życia seksualnego. Rehabilitację po zabiegu i powrót do pełnej sprawności również seksualnej trwa do miesiąca.

MonaLisa Touch™

MonaLisa Touch™

Specjalne podziękowania dla prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty oraz dla prof. dr hab. n. med. Tomasza Paszkowskiego za pomoc merytoryczną w przygotowaniu biuletynu informacyjnego MonaLisa Touch™.



Wyłączny dystrybutor:
ITP S.A.
ul. Joliot-Curie 26/19
02-646 Warszawa
tel +48 722 008 002
www.itpsa.pl
www.itpesthetique.pl
www.monalisalaser.pl

